

PNEUMOCOCCO

2024/2025

Per saperne
di più:



per chi è GRATUITA

offerta per età

65 anni «sani»
(nati nel 1959)

**+ coorti
precedenti**
(dal 1958 al 1952)
non vaccinati



offerta per patologia

Alcolismo cronico; Asplenia anatomica o funzionale e candidati splenectomia; Cardio/pneumo/epatopatie croniche; Diabete mellito; Emoglobinopatie quali anemia falciforme e talassemia; Epatopatie croniche, inclusa la cirrosi epatica e le epatopatie croniche evolutive da alcool; Immunodeficienze congenite o acquisite; Infezione da HIV; Insufficienza renale/surrenalica cronica, sindrome nefrosica o Malattie polmonari croniche; Neoplasie diffuse; Patologie oncoematologiche (leucemie, linfomi e mieloma multiplo); Patologie richiedenti un trattamento immunosoppressivo a lungo termine; Portatori di impianto cocleare; Soggetti con perdite liquorali da traumi o intervento; Trapianto d'organo o di midollo; Difetti congeniti e acquisiti del complemento.

VACCINI e SCHEMI OPERATIVI



vaccinazione precedente

nessuna

PCV20

Solo PPSV23

Solo PCV13/PCV15

PCV13/PCV15
+ PPSV23

vaccinazione da eseguire

Offerta per età: PCV20

Offerta per patologia: PCV20 nei soggetti ad alto rischio, a giudizio del medico, può essere opportuno somministrare una ulteriore dose di PPSV23 a distanza raccomandata di un anno dall'ultima vaccinazione (intervallo minimo 8 settimane)

Offerta per età: nessuna

Offerta per patologia: nei soggetti ad alto rischio, a giudizio del medico, può essere opportuno somministrare una dose di PPSV23 a distanza raccomandata di un anno dall'ultima vaccinazione (intervallo minimo 8 settimane)

PCV20 dopo almeno 1 anno dall'ultima dose

Offerta per età: PCV20 dopo almeno un anno dall'ultima dose a giudizio del medico

Offerta per patologia: PCV20 dopo almeno un anno oppure PPSV23 dopo almeno 8 settimane a giudizio del medico

In caso di vaccinazione con PCV20 nei soggetti ad alto rischio, a giudizio del medico, può essere opportuno somministrare una ulteriore dose di PPSV23 a distanza raccomandata di un anno dall'ultima vaccinazione (intervallo minimo 8 settimane)

Offerta per età: nessuna

Offerta per patologia: nei soggetti ad alto rischio e negli ospiti RSA, a giudizio del medico, può essere opportuno somministrare una ulteriore dose di PCV20 a distanza raccomandata di un anno dall'ultima vaccinazione

altre INFORMAZIONI

dove approvvigionarsi

presso le
farmacie
territoriali

quando
somministrarla
tutto l'anno



come rendicontare

attraverso il
portale
Arvax