

ANTI-HERPES ZOSTER

* Aggiornato al 30 settembre 2025

2025 - 2026

per chi è gratuita

offerta per età

- **65 anni** "sani" (nati nel **1960** e precedenti)

offerta per patologia

- a partire dai 18 anni affetti da diabete complicato, BPCO e asma severo, cardiopatie, soggetti immunodepressi o candidati a terapie immunosoppressive, soggetti con recidive o forme particolarmente gravi di Herpes Zoster, soggetti riceventi trapianto di midollo, soggetti con insufficienza renale cronica e in dialisi
- maggiori di 50 anni affetti da diabete, cardiopatie, BPCO e asma bronchiale

dove approvvigionarsi

- presso le Aziende socio sanitarie territoriali (**ASST**) di competenza territoriale

vaccino disponibile

SHINGRIX®

- è il vaccino utilizzato attualmente in Lombardia
- vaccino ricombinante
- somministrabile in 2 dosi a distanza di 2-6 mesi l'una dall'altra

come rendicontare

- attraverso il portale **ARVAX**



ANTI-PNEUMOCOCCO

* Aggiornato al 30 settembre 2025

2025 - 2026

per chi è gratuita

offerta per età

- **65 anni** "sani" (nati nel **1960** e precedenti)
- ospiti **Rsa**

somministrabile con

- vaccino antinfluenzale
- herpes zoster

come rendicontare

- attraverso il portale **ARVAX**

offerta per patologia

Asplenia anatomica o funzionale e candidati alla splenectomia, soggetti con cardiopatie, classe NYHA ≥ 3 e pazienti post shock cardiogeno, emoglobinopatie quali anemia falciforme e talassemia, immunodeficienze congenite o acquisite (incluse sclerosi multipla, distrofia muscolare, miastenia gravis, sclerosi laterale amiotrofica e altre malattie del motoneurone), infezione da Hiv, insufficienza renale in dialisi, pazienti con fibrosi polmonare idiopatica e malattie respiratorie che necessitano di ossigenoterapia, neoplasie diffuse, patologie onco-ematologiche (leucemie, linfomi e mieloma multiplo), patologie richiedenti un trattamento immunosoppressivo a lungo termine, trapianto d'organo o di midollo, inclusi pazienti in attesa di trapianto

quando somministrarla

- tutto l'anno

dove approvvigionarsi

- presso le **farmacie** durante la campagna antinfluenzale, presso le **Asst** il resto dell'anno

vaccinazione precedente	offerta per età (a partire dai 65 anni)	offerta per patologia (popolazione NON ad alto rischio)	offerta per patologia (popolazione ad alto rischio)
nessuna	PCV20	PCV20	PCV20
PCV20	nessuna	nessuna	V116 dopo almeno un anno da PCV20
PCV13/PCV15 + PPSV23	PCV20 dopo almeno un anno dall'ultima dose	PCV20 dopo almeno un anno dall'ultima dose	PCV20 dopo almeno un anno dall'ultima dose



ANTI-COVID 19

* Aggiornato al 30 settembre 2025

2025 - 2026

per chi è gratuita

offerta per gruppi di persone

- **60 anni "sani"** (nati nel **1965** e precedenti)
- ospiti **Rsa**
- donne che si trovano in qualsiasi trimestre della **gravidanza** o nel periodo "**post-partum**" comprese le donne in allattamento
- **operatori sanitari e sociosanitari** addetti all'assistenza negli ospedali, nel territorio e nelle strutture di lungodegenza; **studenti di medicina**, delle **professioni sanitarie** che effettuano tirocini in strutture assistenziali e tutto il personale sanitario e sociosanitario **in formazione**

offerta per patologia

malattie croniche a carico dell'apparato respiratorio, inclusa l'asma grave, malattie dell'apparato cardio-circolatorio (esclusa ipertensione arteriosa isolata), malattie cerebrovascolari, diabete/altre endocrinopatie severe, malattie neurologiche, obesità (BMI >30), dialisi o insufficienza renale cronica, malattie degli organi emopoietici ed emoglobinopatiepatologia oncologica o onco-ematologica in trattamento con farmaci immunosoppressivi, mielosoppressivi, in attesa di trattamento o a meno di 6 mesi dalla sospensione delle cure, trapianto di organo solido in terapia immunosoppressiva; trapianto di cellule staminali ematopoietiche (entro 2 anni dal trapianto o in terapia immunosoppressiva per malattia del trapianto contro l'ospite cronica); attesa di trapianto d'organo; terapie a base di cellule T esprimenti un Recettore Chimerico Antigenico (cellule CAR-T); immunodeficienze primitive, immunodeficienze secondarie a trattamento farmacologico, asplenia anatomica o funzionale, pregressa splenectomia o soggetti con indicazione alla splenectomia in elezione; infezione da HIV malattie infiammatorie croniche e sindromi da malassorbimento intestinali; sindrome di Down; cirrosi epatica o epatopatia cronica grave; disabili gravi ai sensi della legge 104/1992 art. 3 comma 3.

vaccino

- Comirnaty LP.8.1
- richiamo annuale
- aver contratto una infezione da SARS-CoV-2, anche recente, dopo il precedente richiamo, non rappresenta una controindicazione alla vaccinazione

somministrabile con

- vaccino **antinfluenzale**

come rendicontare

- attraverso il portale **ARVAX**

quando somministrarla

- tutto l'anno

dove approvvigionarsi

- presso le **farmacie** durante la campagna antinfluenzale
- presso le **Asst** il resto dell'anno

Per saperne di più:



ANTINFUENZALE

* Aggiornato al 30 settembre 2025

2025 - 2026

per chi è gratuita

- maggiori di **60 anni** (nati nel **1965** e precedenti)
- persone a rischio per status o patologia
- bambini dai **6 mesi** ai **17 anni**
- donne in **gravidanza** (fino a 6 settimane dal parto)
- familiari e contatti di soggetti ad **alto rischio**
- sanitari, insegnanti, vigili del fuoco e forze dell'ordine
- dal **13 ottobre 2025** disponibile per tutti

somministrabile con

- vaccino Covid-19
- anti- pneumococco
- anti- herpes-zoster
- difterite
- tetano
- pertosse

dove approvvigionarsi

- presso le **farmacie di comunità**

come rendicontare

- attraverso il portale **ARVAX**

vaccini disponibili

EFLUELDA

- somministrabile a partire dai **60 anni**
- indicato negli adulti a partire dai **75 anni**
- ospiti **RSA** a partire dai **60 anni**

FLUAD

- somministrabile a partire dai **50 anni**
- indicato negli adulti a partire **dai 60 anni** e per pazienti cronici
- ospiti **RSA** a partire dai **50 anni**

INFLUVAC TRI S

- somministrabile a partire dai **6 mesi** di vita

FLUENZ

- somministrabile dai **2 ai 17 anni** (compresi soggetti a rischio senza controindicazioni RCP)
- **non** somministrabile **sotto i 2 anni di vita**

Per saperne
di più:

